


用法及び用量

医師又は薬剤師の指示した用法及び用量を守ってください。

1回1個(5mgもしくは10mg)投与の方

1回1噴霧：
片方の鼻のみ



×1


中面のSTEP1～3を片方の鼻に1回行ってください。

スピジア投与後、再度発作が起きて2回目の投与が必要となった場合は、最初に使用してから4時間以上間隔をあけて使用してください。なお、2回目投与後に発作が再発した場合でも、3回目の追加投与はしないでください。

スピジア投与後も改善がみられない場合は、医療機関を受診してください。

1回2個(15mgもしくは20mg)投与の方

1回2噴霧
(1容器1噴霧)：
両方の鼻 1回ずつ



×2

中面のSTEP1～3を両方の鼻に1回ずつ行ってください。

スピジア投与後、以下のいずれかに該当する場合や、あらかじめ医師から説明された、救急搬送が必要となるケースに該当する場合は、救急搬送を手配してください。

- 呼吸抑制のリスクがあると医師が判断した患者
- いつもとは違うと感じた場合
- スピジア投与後、発作がおさまらない場合
- 呼吸の回数が少ない、浅い、又はとまった場合
- 発作がおさまった後も唇が青い状態が続く場合
- 2回目のスピジアを投与した後に発作がふたたびおきた場合
- 上記にあてはまるものはないが必要性を感じた場合
- このほか、医師から特別に指示があり、その症状にあてはまる場合

アキュリスファーマ株式会社

東京都港区北青山2-14-4 the ARGYLE aoyama 6F

EPI008010525F 2025年6月作成

スピジア[®]点鼻液 5mg 7.5mg 10mg の使用説明書

- スピジア点鼻液は、てんかん重積状態及びてんかん重積状態に移行するおそれのある発作がおきた時に投与します。
- 医師又は薬剤師の指示に従い、症状があらわれたときに1回1噴霧(どちらか片方の鼻のみ)もしくは2噴霧(両方の鼻に1回ずつ)してください。
- 振らずに使用いただけます。

詳しい使用方法是
こちらをご確認ください



アキュリスファーマ株式会社

発作が起きたときの対処方法について

- 横向きに寝かせ、楽な姿勢にしてください。
- まわりに危険なものがあれば遠ざけてください。
- からだをしめつけないように、衣服をゆるめてください。

スピジアを使用したときに限らず、いつもと違う発作が起きたときや気になる点があるときは、都度医師に報告・相談するようにしましょう。


注意事項

- 鼻以外には絶対に投与しないでください。
- 噴霧器には1回(1噴霧)分のお薬が入っていますので、噴霧テストはしないでください。
- 使用期限が過ぎたものは使用しないでください。

スピジアの使用方法

STEP 1

手に持つ



人差し指と中指でノズルの両側を押さえ、親指でプランジャーを軽く支える。

STEP 2

鼻のあなに差し込む
(又は鼻のあなにあてる)



ノズルの両側の指が鼻の入り口に触れる程度まで、ノズルの先端を鼻のあなに差し込む(又は鼻のあなにあてる)。

投与できる体勢をしっかりと確保してから投与すること。
スピジアを鼻のあなにまっすぐに差し込む(又はあてる)こと。
なお、スピジア投与時の顔の向きに規定はありません。

STEP 3

カチッと音がするまで押す



親指でプランジャーの下部をカチッと音がするまで押し込む。噴霧後は、噴霧器を鼻から外す。

使用後は、噴霧器を家庭ごみとして、各自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



投与後はプランジャーが押し込まれた状態になります。



噴霧器:PP