

いしきこんだく けいれん、意識混濁時の フローチャート・医師指示書

()年()組()

けいれんの場合

- 全身をガクガクさせる
- 全身をつっぱらせる
- 上記のいずれかで、かつ
- 声をかけても返事がない



- からだを横たわらせる(嘔吐しそうな場合は横向きにする)
- 口にもものは詰めない

意識混濁の場合

- ぼーっとして意識が薄らいでいる



- 倒れないようにささえる
- 座ることができたら座らせる



- 周囲の危険なものを取り除く
- 観察と記録(動画が望ましい)
- 人を呼ぶ



- 5分
 ()分
以内におさまった

意識が
はっきり
した

保健室で経過観察
保護者に連絡する

意識が
はっきり
しない

- 救急車を呼ぶ
 ()

- 5分
 ()分
たってもおさまらない
- 10分
 ()分
以内に反復

医師の指示に基づく処置薬等

- ()
 薬は使わず以下に進む
 (別に指示書あり)

動かなくなり
呼吸がとまった

いちじきゅうめいしよち
一次救命処置(BLS)に進む

BLS: Basic Life Support
心肺停止や呼吸停止に対する緊急時の
一次救命措置

医療機関()主治医()

保護者() フローチャートに同意します

提出日()年()月()日

日本小児神経学会 保育・療育・教育機関におけるけいれん・てんかん児の発作・生活管理 WG 作成 Ver.1 (<https://www.childneuro.jp/about/7295/>)を一部改変